

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОРЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА У ДЕТЕЙ

Е.Г. Аванесова¹, Е.М. Гилилова¹, И.В. Куц¹, М.Ю. Готовский², Д.Г. Бочаров²

¹Детская поликлиника №81, (г. Москва), ²Центр интеллектуальных меди-цинских систем «ИМЕДИС», (г. Москва)

Своевременная профилактика гриппа у детей является наиболее актуальным вопросом в педиатрии. Одним из современных методов терапии и профилактики многих заболеваний, как у детей, так и у взрослых является биорезонансная терапия (БРТ) [1].

Лечебное и профилактическое использование БРТ максимально индивидуализировано и не вызывает побочных явлений, что позволяет рассматривать этот метод как один из наиболее оптимальных для применения в педиатрии. В процессе проведения БРТ врач-педиатр может выбирать те терапевтические и профилактические режимы, которые наиболее оптимальны для конкретного ребенка.

Цель исследования – оценка эффективность применения эндогенной биорезонансной терапии в комплексной профилактике гриппа у детей.

Материалы и методы

Работа выполнена на базе консультативно-диагностического центра детской городской поликлиники № 81 г. Москвы, где проводилась апробация аппаратно-программного комплекса «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ» (регистрационное удостоверение № ФС 022а2005/2263-05), разработанного в Центре интеллектуальных медицинских систем «ИМЕДИС» под руководством профессора Ю.В. Готовского.

Обследование и наблюдение проводилось у 78 детей в возрасте от 3 до 14 лет, которые были разделены на три группы.

В первой группе (32 ребенка) профилактика гриппа проводилась гомеопатическими препаратами (комплексное гомеопатическое средство «Антигриппин 3», комплексный препарат «Aconit 6, Belladonna 3, Brionia 3X» по стандартным схемам в возрастных дозировках, препарат *Calcarea carbonica* 30 по 1 драже 2 раза в неделю) в сочетании с эндогенной БРТ.

Профилактический курс БРТ состоял из 5–7 сеансов с интервалом 7–14 дней. Эндогенная БРТ применялась по всем меридианам с использованием иммуностимулирующих и противовоспалительных частот в режиме временной модуляции.

Во второй группе (25 детей) профилактика гриппа осуществлялась теми же гомеопатическими средствами по тем же схемам, что и в первой группе, но без применения БРТ (группа плацебо).

В третьей группе (21 ребенок) профилактика гриппа с использованием гомеопатических препаратов и БРТ не проводилась, ввиду отказа родителей (контрольная группа).

Полученные результаты и их обсуждение

В первой группе обследованных заболеваемость гриппом отмечена у 2-х детей, что составило 6%, при этом течение гриппозной инфекции было среднетяжелым, с субфебрильной температурой и слабовыраженными проявлениями интоксикации. Побочных явлений не отмечалось ни в одном случае. Помимо высокой резистентности к гриппозной инфекции родители детей первой группы отмечали улучшение или полное исчезновение жалоб, связанных с наличием у ребенка сопутствующих заболеваний (дискинезия желчных путей, вегето-сосудистая дистония, синдром внутричерепной гипертензии). В этой группе, по отзывам родителей, также отмечалось повышение успеваемости у детей школьного возраста и улучшение их общего самочувствия.

Во второй группе заболеваемость составила 12% (3 ребенка), при этом у 2-х детей гриппозная инфекция осложнилась вторичными бактериальными осложнениями (катаральный отит у одного ребенка и трахеобронхит у другого). Оба ребенка были в возрасте 4-х лет, течение вторичных бактериальных осложнений было среднетяжелым.

В третьей группе заболеваемость гриппом составила 38% (8 детей), при этом течение гриппозной инфекции в 12% случаев было среднетяжелым, а в 26% – тяжелым с выраженными явлениями нейротоксикоза. В 18% случаев течение гриппа у детей осложнялось присоединением вторичной бактериальной инфекции и наличием соответствующих заболеваний (гайморит, отит, трахеобронхит, у 1 ребенка – бронхопневмония), которые отличались тяжелым течением.

Выводы

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о целесообразности приме-

нения эндогенной БРТ в комплексе с гомеопатическими препаратами при профилактике гриппа у детей. Метод БРТ является высокоэффективным не только для предупреждения возникновения гриппозной инфекции, но и для коррекции имеющихся нарушений и улучшающим общее состояние организма ребенка в целом.


Литература

1. Биорезонансная терапия: Методические рекомендации / Мейзеров Е.Е., Блинков И. Л., Готовский Ю.В., Королева М.В., Каторгин В. С. – М.: НПЦТМиГ МЗ РФ, 2000. – 28 с.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Приглашаем Вас посетить интернет-сайт нашего журнала

www.tradmed.ru



Здесь Вы можете ознакомиться с информацией о новом, а также предыдущих номерах журнала; сведениях о событиях в области традиционной медицины; требованиями к направляемым в адрес редакции статьям.